


血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質

外用泡状スプレー0.3%「ニットー」を  
使用されている方へ

100g

このおくすりは、  
皮膚の病気の治療のための医療用医薬品です。  
医師の指示に従い、1日1～数回適量を手のひらで  
やさしく患部にのばすようにぬってください。




### ⚠️ ご使用に際しての注意

- 顔や頭に使用する場合は、耳や鼻の中に入らないように注意してください。
- 傷口や皮膚のただれているところ（潰瘍やびらん面）にはぬらないでください。
- 本剤をぬって皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 目の中や目の周辺には使用しないでください。万一、目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

### ⚠️ 取扱い上の注意

- 初めて使用する際は、真つすぐ立て、3～4回空噴霧した後、使用してください。
- 使用した後は吐出口を拭き取り、付属のキャップをして、なるべく涼しいところで保管してください。

●横にしない



●水洗いしない



●逆さにしない



●振らない



●針で突かない




# 100g容器の使用量の目安

1プッシュで大人の手のひら2枚分くらいの面積\*1に塗ることができます。



1プッシュ量



※軟膏剤の1FTU\*2  
(finger tip unit)  
分に相当します。

\*1,2:Long CC et al.:Arch Dermatol.128:1129-1130,1992  
\*2:1FTU=成人の人差し指の先端から1つ目の関節の長さまで出した量



成人

顔～首 2.5プッシュ

片腕 3プッシュ

胸～おなか 7プッシュ

背中～腰 7プッシュ

片脚 6プッシュ

足首より下 2プッシュ



Long CC et al.:Clinical and Experimental Dermatology.16:444-447,1991より作図

小児

年齢	顔～首	背中～腰	胸～おなか	片腕～片手	片脚～片足
3～6 ヶ月	1	1.5	1	1	1.5
1～2 歳	1.5	3	2	1.5	2
3～5 歳	1.5	3.5	3	2	3
6～10 歳	2	5	3.5	2.5	4.5

プッシュ数

Long CC et al.:British Journal of Dermatology.138:293-296,1998より作表

※上記はあくまでも目安です。医師の指示に従い、実際の症状や体格に合わせてお使いください。